

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA: SIGMOSKOPIA (1/2)

Przed badaniem

- pacjenci z zaparciami na 7 dni przed badaniem powinni zacząć stosować dietę lekkostrawną
- na 3 dni przed badaniem nie należy spożywać żadnych pokarmów, zawierających drobne pestki (np.: winogrona, kiwi truskawki, maliny, arbuzy, jagody, pomidory), pokarmów z makiem i kapustą, siemienia lnianego. Pestki mogą przykleić się do jelita i utrudniać badanie

Dzień przed

- pacjenci z zaparciami powinni przyjąć środek przeczyszczający (np. Bisakodyl - 2 tabl.)

W dniu badania

- nie można jeść
- można pić klarowne płyny, w ilości zaspokajającej pragnienie
- jeżeli badanie będzie wykonywane w znieczuleniu ogólnym dożylnym, na 4 godziny przed badaniem należy przestać przyjmować płyny

Przed/w trakcie

- przed badaniem należy wypełnić i podpisać stosowną zgodę

Po badaniu

- po zakończeniu badania można pić i jeść
- jeżeli pojawią się wzdęcia lub kurczowe bóle brzucha, należy zastosować Espumisan (3 x 2 tabl.) lub No-spa (3 x 1 tabl.)

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA: SIGMOSKOPIA (2/2)

Pozostałe informacje:

- można przyjmować przewlekle stosowane leki
- w przypadku leków na cukrzycę lub przeciwkrzepliwych - ich dawki i sposób przyjmowania leków uzgodnić z lekarzem
- na 7 dni przed badaniem odstawić preparaty z żelazem
- po wypiciu roztworu powinny wystąpić liczne wypróżnienia
- na badanie wskazane jest zgłoszenie się z osobą towarzyszącą
- na badanie wskazane jest zabranie ze sobą niewielkiego posiłku, który będzie można spożyć po badaniu